تربية الأرانب وأمراضها

❖ م. محمد أسعد الخطيب



كانت تربية الأرانب في الماضي تربية هامشية تتم على جانب المزرعة ومع تزايد عدد السكان وحاجة الإنسان للبروتين الحيواني أصبحت الأرانب تربى بطريقة عصرية ومتطورة شأنه شأن الحيوانات الداجنة الأخرى (دجاج-فري-رومي-نعام) والأرنب حيوان صغير يتراوح حجمه مابين ٣-٨ كغ حسب الصنف والسلالة حيث أن الأرنب من الحيوانات كثيرة الإنتاج حيث يبلغ إنتاجه من اللحم ١٢٠ كغ في السنة.



مواصفات الأرنب الجيد:

١- العين لمّاعة.

٢- الأذن نظيفة.

٣- فتحة الشرج نظيفة.

٤- عدم تشوه الأسنان.

٥- خلو الأرنب من مرض الجرب حيث تظهر قشور بيضاء بين الأصابع بالنسبة للأرنب المصاب بمرض الجرب وبالنسبة للذكور الأرجل الخلفية مهمة للتلقيح.

الحمل والولادة:

فترة الحمل عند الأم من ٢٨-٣٢ يوماً ومتوسط عدد المواليد ثمانية أرانب ويتراوح عدد المواليد مابين ٣-١٢ أرنباً والنضج الجنسي للأرنب مابين ٥-٦ أشهر ويفضل أن يكون الذكر أكبر من الأنثى حوالي واحد شهر ونسبة الذكور إلى الإناث ١-٥ حيث يفضل إجراء التلقيح للأم بعد أحد عشر يوماً من الولادة للاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى للأم حيث يتم التأكد من الحمل بعدة طرق:

- عملية الجس لقرني الرحم حيث نجد المواليد على شكل حبات الفول وذلك بعد عملية التلقيح بعشرة أيام.

- بعد مرور أسبوعين نلاحظ انتفاخ بطن الأنثى وبعد ثلاثة أسابيع حلمات الأنثى تصبح أكبر.

- يتم التأكد من الحمل عن طريق وزن الأنثى.

حيث يحدد تاريخ الولادة بدءاً من التلقيح ويهيأ صندوق الولادة ويفرش بتبن ناعم قبل الولادة.



بعد الولادة يجب الاهتمام بالأم ومواليدها من جهة التغذية والرعاية ، إذا وضعت الأم ثلاثة مواليد ممكن أن نقل هذه المواليد إلى أم أخرى وضعت خمسة مواليد ويتم تلقيحها مباشرة (الأم التي وضعت ثلاثة مواليد وتم نقل مواليدها للأم الأخرى) وذلك للاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمزرعة وفي حال وجود أم وضعت ١١ مولوداً وأم أخرى وضعت خمسة مواليد يتم نقل ثلاثة مواليد من الأم التي وضعت ١١ مولوداً إلى الأم التي وضعت خمسة مواليد، حيث أن أنثى الأرنب تملك فقط ثماني حلمات للإرضاع ، يفضل أن تفطم المواليد بعمر ٢١ يوماً حيث تأكل مع الأم العلف ويجب أن تبقى الأم مع مواليدها حتى ٣٠ يوماً.

الظروف البيئية المثالية للأرنب:

- درجة الحرارة المثلى لتربية الأرنب مابين ١٥-١٨ درجة مئوية في النظام المفتوح إذا وصلت درجة الحرارة حتى ٤٠ درجة مئوية توقف التربية.
- الرطوبة من ٦٥-٧٥ ٪.
- التهوية ضرورية على صحة الأرانب.
- الإضاءة: مساحة النوافذ المخصصة للإضاءة تساوي ٢٠٪ من مساحة الأرضية ، يجب أن نكمل الإضاءة الطبيعية حتى ١٦ ساعة.
- التربية المثالية للأرانب في الأقفاص.

التغذية:

تعتمد المواليد الصغيرة في الشتاء على الأعلاف حصراً أما الأرانب الكبيرة يجب أن تكون نسبة البروتين ١٦٪ ، الألياف مابين ١٢-١٤ ٪ ، الطاقة مابين ٢٣٠٠-٢٧٠٠ كيلو كالوري لكل كيلو غرام ويجب أن تضاف الأملاح المعدنية والفيتامينات للخلطة الجاهزة وهذه خلطة مثالية لأرانب التربية والنمو ٣٥ كيلو غرام دريس + ٢٥ كيلو غرام كسبة فول صويا+ ٣١ كيلو غرام رضّة + ١٠ كيلو غرام ذرة + ٠,٤٥ كيلو غرام + أملاح معدنية وفيتامينات ٠,٣ كيلو غرام

حيث أن الخلطة الناعمة تسبب ارباكات تنفسية.

أخطر الأمراض التي تتعرض لها الأرانب:

كوكسيديا الأمعاء وكوكسيديا الكبد: يصيب كل الحيوانات وخاصة الصغار ويسبب الإسهال والتوقف عن النمو والموت المفاجئ وذلك نتيجة الإصابة بعدة جراثيم وللوقاية من هذا المرض يجب تربية الأرانب في الأقفاص وتطهيرها بعد بيع كل فوج من أرانب التسمين.

الرشح والزكام: يصيب كل الحيوانات وفي جميع الأعمار يسبب عطساً مسترسلاً وسيلان مادة بيضاء من الأنف وذلك لوجود نوعية سيئة من الهواء (بارد-رطب-مليء بالغبار) أو لوجود أرانب في مجرى هوائي.

الجرب: يصيب الأذنين والظهر وأرجل الأرانب في كل الأعمار وخاصة الكبار وهو مرض معدي ومن الصعب القضاء عليه ، من علاماته ظهور قشور جلدية على الأرجل والأذنين والأنف.

تصمغ الأذن: وهو مرض خطير يصيب الأرانب ويسبب احتقانات والتهابات في مجرى الأذن الداخلية وعند حدوث الإصابة لا بد من المعالجة الفورية بالماء الأكسجيني + مرهم مناسب.

التسمم الدموي: وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الأرانب ويوجد حالتان للتسمم الدموي الفيروسي (حاد) والتسمم الدموي البكتيري (أقل خطورة).

التسمم البكتيري يمكن علاجه من خلال إضافة الفيتامينات والعناصر المعدنية لرفع مناعة الحيوان في حالة التسمم البكتيري تمتنع الأرانب عن الأكل ويخرج الدم من جميع أجزاء الجسم ويكون معدل النفوق محدوداً.

في التسمم الفيروسي يكون معدل النفوق مرتفعاً جداً يصل مابين ٧٠-٩٠٪ وفي هذه الحالة قد تلفظ الأم مواليدها ويتم الوقاية من هذا المرض من خلال التحصين كل أربعة أشهر.